

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NISKU
W SPRAWIE OBOWIĄZKU POWIADAMIANIA
O PADŁYCH DZIKICH PTAKACH !!!

W związku z występowaniem na terytorium Polski licznych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku informuje o obowiązku powiadamiania o znalezieniu padłych dzikich ptaków.

Zimujące w Polsce dzikie ptactwo, głównie przedstawiciele blaszkodziobych - gatunki związane ze środowiskiem wodnym takie jak kaczki, gęsi i łabędzie, stanowi rezerwuuar wirusa grypy ptaków i może przyczynić się do zakażenia drobiu utrzymywanego w gospodarstwach oraz rozprzestrzeniania choroby na znaczne odległości.

Inne grupy ryzyka mogące mieć znaczenie w przenoszeniu wirusa to ptaki należące do rzędu siewkowatych, na przykład mewy, rybitwy, bekasy, czajki oraz ptaki drapieżne i krukowate.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku apeluje o niezwłoczne zgłaszanie przypadków znalezienia padłych ptaków należących do wymienionych grup ryzyka do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku pod nr telefonu 15 841 21 28.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce
hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji
minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków
do gospodarstwa, w szczególności:


1. Przetrzymanywać drób na ogrodzonej przestrzeni,
pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych
lub pod szczelnym przykryciem,
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych,
do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami
umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta)
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu


Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody;
objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu;
duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności




Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?

- 


1

Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!
- 


2

Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.
- 


3

Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i reguluj je nasączając aktywnym środkiem odkażającym.
- 


4

Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).
- 


5

Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmnienić ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.
- 


6

Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.
- 


7

Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.
- 


8

Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.
- 


9

Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.
- 

10

Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.
- 

11

Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.
- 

12

Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skrzęty szyi, drgawki, biegunka, duszność) Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!